

Codice Paziente: [REDACTED]
Numero Cartella Clinica: 0

A.N.: [REDACTED]

Paziente: [REDACTED]

Data di Nascita: [REDACTED] 9

Sesso: F

Provenienza: **Esterno SSN**

ESAMI: TC TORACE (senza e con contrasto)	20/04/2011
TC ADDOME SUP. (senza e con contrasto)	20/04/2011
TC ADDOME INF. (senza e con contrasto)	20/04/2011

REFERTO

Lo studio è stato condotto senza e con introduzione endovenosa di m.d.c. iodato, non ionico. Esame a confronto con precedente del 28 settembre 2010.

In sede sovraclavare, sottoascellare, paratracheale alta e bassa destra e sinistra, nella finestra aorto-polmonare, nel recesso interazygos-esofageo, in sede tracheobronchiale destra, peribronchiale destra e sinistra, sottocarenale, paraesofagea e retrocrurale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

Stabile la lesione nodulare ipodensa solida, di circa 1 cm di diametro, sita al lobo polmonare inferiore sinistro e l'altra di circa 0,8 cm al lobo polmonare inferiore destro.

Alla cupola epatica (VIII seg.) è oggi apprezzabile lesione nodulare rotondeggiante ipodensa solida, di circa 1,7 cm di diametro, ripetitiva.

Comparsa di noduli di carcinosi peritoneale, maggiormente rappresentati nella doccia parieto-colica destra. Assente versamento addominale.

Normale la morfologia delle vie biliari intra ed extra-epatiche.

Libero l'ilo epatico e splenico.

Nulla a carico di milza, pancreas, reni e surreni.

Al tripode celiaco, in sede mesenterica superiore ed in sede para-aortica, para-cavale ed interaortico-cavale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

Regolare la morfologia della vescica urinaria.

In sede ilio-pelvica, otturatoria ed inguinale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

Assenti sicure lesioni ripetitive ossee.

[REDACTED]

[REDACTED]