

Codice Paziente: [REDACTED]
Numero Cartella Clinica: 0
Paziente: [REDACTED]
Sesso: F

A.N.: [REDACTED]
Data di Nascita: [REDACTED] 9
Provenienza: Esterno SSN

ESAMI:	TAC del CAPO CON E SENZA MEZZO DI CONTRASTO	13/06/2012
	TC TORACE (senza e con contrasto)	13/06/2012
	TC ADDOME COMPLETO(senza e con contrasto)	13/06/2012

REFERTO

Lo studio è stato condotto senza e con introduzione endovenosa di m.d.c. iodato, non ionico.
ENCEFALO:

Sistema ventricolare in asse, non dilatato.

Assenti alterazioni morfo-densitometriche a carico del parenchima cerebrale e cerebellare.

Spazi sub-aracnoidei di normale ampiezza.

Tumefazione ovalare a margini regolari, ipodensa solida, di circa 36 mm di diametro si reperta a carico del sottocute della regione occipitale destra.

TORACE-ADDOME SUPERIORE-INFERIORE:

Esame a confronto con precedente del 17 gennaio 2012.

In sede sovraclaveare, sottoascellare, paratracheale alta e bassa destra e sinistra, nella finestra aorto-polmonare, nel recesso interazygos-esofageo, in sede tracheobronchiale destra, peribronchiale destra e sinistra, sottocarenale, paraesofagea e retrocrurale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

Assenti lesioni ripetitive parenchimali polmonari.

Progressione del tessuto patologico peritoneale, diffuso a tutto il grande omento, che

"indenta" la superficie epatica con comparsa di modesto versamento addominale.

Fegato steatosico con stabilità del nodulo ipodenso alla cupola epatica.

Normale la morfologia delle vie biliari intra ed extra-epatiche.

Libero l'ilo epatico e splenico.

Nulla a carico di milza, pancreas, reni e surreni.

Al tripode celiaco, in sede mesenterica superiore ed in sede para-aortica, para-cavale ed interaortico-cavale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

Regolare la morfologia della vescica urinaria.

In sede ilio-pelvica, otturatoria ed inguinale non si repertano linfonodi aumentati di volume.

[REDACTED]

[REDACTED]