

Codice Paziente: [REDACTED]

Esame del: 10/05/2011

Cognome e nome: [REDACTED]

Numero Esame: [REDACTED]

Data di nascita: [REDACTED]

Data Referto: 12/05/2011

Provenienza: S.S.N.

TAC ENCEFALO SENZA E CON M.D.C.

TAC ADDOME COMPLETO SENZA E CON M.D.C.

TAC TORACE SENZA E CON M.D.C.

TAC ADDOME FASE TARDIVA

TAC TORACE FASE TARDIVA

MIP -TAC

TAC COLLO SENZA E CON M.D.C.

L'indagine TC del torace eseguita in acquisizione volumetrica con TC spirale multistrato, sia in condizioni di base che in fase di somministrazione endovenosa di m.d.c. evidenzia la presenza di unico processo espansivo nodulare allungato, apprezzabile dall'apice di sinistra (K su cicatrice) con estensione cranio caudale sino all'ilo omolaterale (cm 4 x cm 4 circa).

Linfonodi aumentati di volume di aspetto disomogeneo si repertano nelle stazioni mediastiniche a sede prevascolare.

ascellari.

Non versamento pleurico.

Enfisema apicale bilaterale.

L'indagine TC dell'addome superiore ed inferiore eseguita in acquisizione volumetrica, con TC spirale multistrato, sia in condizioni di base che in fase di somministrazione endovenosa di m.d.c., mostra fegato volumetricamente nei limiti, in assenza di lesioni focali di natura primitiva o secondaria.

Colecisti in sede, normodistesa, a pareti regolari.

Pancreas di regolare morfologia.

Milza a densità omogenea.

Surreni nei limiti.

Reni in sede normofunzionanti.

Non si rilevano significative tumefazioni linfonodali nelle stazioni linfonodali addominali o pelviche.

Nei limiti gli organi pelvici.

L'indagine TC dell'encefalo eseguita in acquisizione di scansioni assiali contigue a strato sottile, in condizioni di base e dopo somministrazione endovenosa di m.d.c.

mostra